



احتیاطات استاندارد

احتیاطات استاندارد

هیله احتیاطات استانداره را ارجاعات کنید



تغییه و تنظیم : کارگروه ایمنی بیمار
معاونت درمان

منبع : دستورالعمل کنترل عفونت

شهریور ماه سال ۱۴۰۲

۴. عدم دستکاری سر سوزن ها و وسایل تیز، در پوش سوزن ها نباید مجدداً روی سوزن ها قرار بگیرد و سر سوزن ها نباید خم یا شکسته شوند

۵. سر سوزن ها و وسایل نوک تیز باید در ظروف مقاوم به سوراخ شدگی دفع گردد



۳. استفاده از گان ، محافظ چشم همراه با ماسک یا محافظ صورت در صورت انجام عملی که احتمال پاشیده یا پخش شدن مایعات بدن وجود دارد



روش درست شستن دست‌ها

نها زمانی است ها را پوشید که تکنی دیده، در غیر این صورت، ماش دست با زل استریل را آنجام دهد!

مدت زمان این روش: بین ۱۴-۲۰ ثانیه



۱. پوشیدن دستکش: پوشیدن دستکش هنگام تماس با خون ، مایعات بدن ، ترشحات و مواد دفعی و لوازم آلوده خارج کردن دستکش بلا فاصله پس از اتمام پروسیجر و قبل از دست زدن به وسایل غیر آلوده و سطوح محیطی و قبل از رفتن به بالین بیمار بعدی و تعویض دستکش ها ، زمان پایان پروسیجر آلوده و قبل از شروع پروسیجر بعدی برای همان بیمار

۲. شستن دست ها : قبل و بعد از تماس با بیمار ، بعد از تماس با خون ، مایعات بدن ، ترشحات و مواد دفعی ، غشای محیطی ، پوست آسیب دیده ، اشیا آلوده بلا فاصله پس از خروج دستکش و در فواصل تماس بین بیماران

احتیاطات استاندارد مجموعه اقداماتی است که برای پیشگیری از انتقال میکرو ارگانیسم ها به کارکنان و بیماران انجام میشود

احتیاطات استاندارد بنیادی برای ایمنی مراقبت از بیمار و کاهش خطر انتقال عفونت است

این مفهوم در هر مکانی که از بیمار مراقبت میشود و برای کلیه بیماران و در تمام اوقات قابل اجرا است

این احتیاطات لازم است که در مواجهه با خون ، کلیه مایعات بیولوژیک بدن غیر از تعریق ، پوست آسیب دیده و غشاها مخاطی به کار برد شوند

احتیاطات استاندارد جایگزین احتیاط های همه جانبی یا عمومی شده است و رعایت آن ها برای تمام بیماران ضروری است

