

سؤالات Pretest و Posttest سمینار بحران های مامایی و اداره آنها :

۱ - انجام C/S به چه صورت به احیا (CPR) کمک میکند ؟

- الف- برداشتن فشار از روی آئورت و ورید اجوف تحتانی و بهبود بازگشت وریدی
- ب- کاهش نیازهای متابولیکی
- ج- بهتر شدن تاثیر ماساژ قفسه سینه
- د - همه موارد

۲ - تشخیص ایست قلبی در بیمار به چه صورت است؟

- الف- نداشتن نبض محیطی
- ب - نداشتن تنفس
- ج - عدم پاسخدهی و تنفس غیرطبیعی
- د - از روی ECG

۳ - درمان ضد فشارخونی و ضد تشنجی تا چه زمانی بعد از Delivery باید ادامه یابد؟

- الف - ۲۴ ساعت ب- ۴۸ ساعت ج - ۷۲ ساعت د - ۶ ماه

۴ - شایعترین علامت آمبولی ریه کدام است؟

- الف- افت فشارخون ب- هایپوکسی ج-ادم ریه د- شوک

۵ - هنگام افت فشار خون در مادر باردار تریم بستری کدام اقدام صحیح نیست؟

- الف - تجویز سرم نرمال سالین
- ب - تجویز دوپامین
- ج - تجویز افدرین
- د - Left lateral position

۶ - در مداخلات حیاتی در مادر باردار بد حال کدام مورد مناسب نیست؟

- الف - تجویز اکسیژن ۱۰۰٪
- ب - Left lateral position
- ج - گرفتن I.V line هرچه زودتر و از هر جایی که امکان دارد
- د - تلاش برای تشخیص و درمان علل قابل برگشت بوجودآورنده وضعیت بحرانی