

شماره ۵۴۰۰/۲۷۰۵
تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
پیوست دارد

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان

از طریق سیستم جاری کردن دبیرخانه معاونت درمان
دریافت شد

معاونین محترم درمان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: مسمومیت اتفاقی در کودکان با متادون

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۴۰۰/۸۰۶۲ مورخ ۹۰/۱۰/۶ در خصوص پیشگیری از مسمومیت اتفاقی افراد به خصوص کودکان با شربت متادون، خواهشمند است مراتب ابلاغی در نامه مذکور و همچنین موارد ذیل در اسرع وقت به مراکز درمان سوء مصرف مواد ابلاغ گردد:

۱- تحویل دوز منزل دارو در شیشه های دربدار با قفل کودک و برچسب هشدار

۲- نگهداری شربت متادون در ظروف دارای برچسب علامت خطر جهت مصرف در کودکان

۳- آموزش خانواده ها در خصوص قرار ندادن متادون در دسترس کودکان

همچنین خواهشمند است دستور فرمایید مراتب پیگیری و برخورد مناسب با مراکز متخلف انجام و از نتیجه این حوزه را مطلع فرمایید.

دکتر عباسعلی ناصحی
فام مقام معاون درمان در حوزه سلامت روان و اعتیاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
دبیرخانه معاونت درمان
شماره: ۲۲۰۷۵۲
۱۳۹۲/۳/۶

۱- ...
۲- ...



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۸۰۶۲/۵۴۰۰
تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
پیوست ندارد

معاونت های محترم درمان کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

با سلام و احترام

با توجه به گزارشات واصله درخصوص موارد مسمومیت اتفاقی افراد غیر مبتلا به سوء مصرف مواد به خصوص کودکان با شربت متادون، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب زیر در اسرع وقت به کلیه مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی ابلاغ گردد:

۱- با اقدامات انجام شده توسط سازمان محترم غذا و داروی کشور مقرر شده است ظروف پلاستیکی ۶۰ سی سی با برچسب هشدار توسط شرکت داروسازی تولید کننده شربت متادون توزیع گردد.

۲- شربت متادون برای دوز منزل فقط در ظروف پلاستیکی تیره رنگ دارای درپوش محافظ کودکان (child proof) به بیماران تحویل شود.

۳- بر روی تمام شیشه های مذکور باید برچسب هشدار الصاق شود.

۴- بروشور های اطلاع رسانی درمورد خطرات استفاده از این دارو توسط افراد غیر مبتلا به سوء مصرف مواد، خصوصا اطفال تهیه و در اختیار مراجعین قرار داده شود.

۵- مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد باید خطرات استفاده از این دارو توسط افراد غیر مبتلا به سوء مصرف مواد، خصوصا اطفال را بطور شفاهی به اطلاع هر یک از بیماران برسانند.

۶- اجرای دقیق مفاد پروتکل درمان با آگونیزست درخصوص نحوه ارائه دوز منزل با تاکید بر مصرف اولین دوز در مرکز درمانی تحت نظارت فرد مسئول توزیع دارو الزامی است.

۷- در صورت مشاهده تخلف از موارد مذکور برای بار اول تذکر کتبی و ثبت در سوابق مرکز، برای بار دوم کاهش سهمیه داروی آگونیزست به میزان ۱۰ درصد تا تصحیح فرآیند مورد اشاره و برای بار سوم طرح موضوع در کمیته نظارت دانشگاه علوم پزشکی (کمیته ماده ۳۱) جهت اتخاذ تصمیم در خصوص لغو پروانه پزشک مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد انجام شود. همچنین مراتب لغو مسئولیت فنی پزشک مرکز به مراجع ذیربط شامل سازمان نظام پزشکی استان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت متبوع اطلاع داده شود.

۸- در مورد شربت اپیوم هم تمام موارد فوق الذکر بطور کامل رعایت گردد.

دکتر عباسعلی ناصحی
قائم مقام معاون درمان در حوزه سلامت روان و اعتیاد