



معاونین محترم درمان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: درمان وابستگی به مواد مخدر با تنتور اپیوم

با سلام و احترام

با توجه به سوالات مطرح شده از سوی درانگران و کارشناسان محترم در ارتباط با پروتکل درمان سوء مصرف مواد مخدر به کمک تنتور اپیوم، موارد ذیل یادآوری می گردد:

- در الگوی درمان نگهدارنده با هدف اولیه کاهش آسیب، در صورت صلاحدید پزشک معالج و بر حسب شرایط بیمار در صورت قصد جایگزینی تنتور اپیوم با داروی متادون، لازم است پس از قطع کامل تننور و بروز علائم mild withdrawal داروی متادون مطابق با پروتکل درمان سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست تجویز گردد. بدیهی است بیمار می بایست دارای اندیکاسیون ورود به درمان نگهدارنده با داروی آگونیست متادون باشد.

- در برنامه اولیه الگوی کاهش تدریجی تنتور اپیوم با هدف قطع کامل و رسیدن به پرهین، که بیماران تحت درمان با این روش اندیکاسیون درمان با داروی آگونیست متادون را نداشته اند، لازم است کاهش تدریجی داروی تننور اپیوم بر اساس پروتکل صورت گرفته و داروی بیمار در زمان تعیین شده قطع گردد.

دکتر عباسعلی ناصحی
قائم مقام معاون درمان در حوزه سلامت روان و اعتیاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
دفتر معاونت درمان
شماره : ۲۲۰۹۴۹۹
۱۳۹۲ / ۳ / ۱۱